

## ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είδος στόχος	Πεδίο εφαρμογής	Δοσολογία
Ποντικός ( <i>Mus musculus</i> )	Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια	25 έως 50γρ. δολωμάτων ανά θέση δόλιωσας. Σε ελαφριές προσβολές οι θέσεις δόλιωσας θα πρέπει να απέχουν 4μ. Σε βαριές προσβολές οι θέσεις δόλιωσας θα πρέπει να απέχουν 2μ.
Αρουραίοι ( <i>Rattus rattus</i> , <i>R. Norvegicus</i> )	Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια	50 έως 250γρ. δολωμάτων ανά θέση δόλιωσας. Σε ελαφριές προσβολές οι θέσεις δόλιωσας θα πρέπει να απέχουν 10μ. Σε βαριές προσβολές οι θέσεις δόλιωσας θα πρέπει να απέχουν 5μ.

### Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών. Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλιωσας θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προστές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.

Τα δολωμάτα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εντός δολωματικών σταθμών. Δολωματικοί οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδεις δολωματικούς σταθμούς. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα.

Η δόλιωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλιωσας πρέπει να αλληλζούν περιοδικά.

Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.

Τα δολωμάτα πρέπει να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κατά πρόταση την 4η και 7η ημέρα μετά την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως ανά 7 ημέρες) και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώνονται από τα τρωκτικά.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά.

Όταν τα δολωμάτα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολωμάτα θα πρέπει να επισμαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολωμάτα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθετησών δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Τα δολωμάτα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολωμάτων που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μια θέση δόλιωσας (ποντικού ή αρουραίου).

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και κατά πρόταση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.

Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

### Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον

Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και ήψατε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολωμάτων που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά. Τα αντιπηκτικά τρωκτοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολωμάτα.

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος:

Τα δολωμάτα δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μην φαγωμένα δολωμάτα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης.

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σκόμιση και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

# Notrac™

## PELLETS

Bromadiolone (Βρομαδιολόνη) 0,005%  
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κουφέτο (pellets)

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας Υ.Α.Α.&Τ : ΤΠ14-0088/29-07-2014

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Bromadiolone 0.005 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

Περιέχει τον πικραντικό – αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate  
Χρώμα μπλε

Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus rattus* και *R. norvegicus*).

Αρκεί ένα και μόνο γρομάκι από τα τρωκτικά για να πληθθεί με το δόλωμα η θανατηφόρος δόση.

“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”



Κάτοχος της έγκρισης, Παρασκευαστής του σκευάσματος: Bell Laboratories, Inc-European Division, Chaucer House, Chaucer Road CO10 1LN, Ηνωμένο Βασίλειο.



Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

PROTEKTA A.E.

Αγ. Παύλου 39, 121 32 Περιστερί, ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 8542220, 210 8542270, Fax. 210 8542253

www.protecta-health.gr • e-mail: info@protecta-health.gr



Το Notrac είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Bell Laboratories Inc.-WI, U.S.A.

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΙΛΑ

5	10	20	25

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Μακριά από παιδιά
- Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση
- Φυλάσσεται κλειδωμένο

Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη). - Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθυστα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. - Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολωμάτων.

Όταν τα δολωμάτα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολωμάτα θα πρέπει να επισμαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολωμάτα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησας δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

“Για να αποφυγτε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

**Πρώτες βοήθειες:** Η βρομαδιολόνη (bromadiolone) αποτελεί ένα αντιπηκτικό που ενδοχόμενος να προκαλέσει αιμορραγία (η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδοχόμενος να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλέβια) για αρκετές εβδομάδες.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα μάτια ανοικτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά τις ώρες. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν υπάρχουν– μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλύνετε τα μάτια. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης (ρινορραγίες, αίμα στα ούλα, αιμόπτυση, ξαφνικός και ασυνήθιστος πόνος στην κοιλιακή χώρα, αίμα στα ούρα, αύξηση χρόνου πήξεως του αίματος).

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης όμοια με τα παραπάνω.

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα. Μην προκαλέτε εμετό εκτός και αν συμβουλευθείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

### ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:

Πωλείται από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Επιτρέπεται η πώληση του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

### Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος -

#### Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:  
(PROD. DATE):

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:  
(LOT No):

ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ