

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών και σε υπονόμους.

Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προσφυγμένες και μη προσετές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά. Επίσης θα πρέπει να είναι προστατευμένες από τη βροχή και να διασφαλίζεται ότι τα δολώματα δεν θα παρασυρθούν από το νερό. Κατά τη τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσής τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μη μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δολώμα, ώστε να μη συγχέονται με άβλαβους δολωματικούς σταθμούς. Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.

Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια. Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται καθημερινά και να αναπληρώνονται μέχρι να σαματήσουν και τρώγονται από τα τρωκτικά.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνίσταται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά.

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση, στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολωμάτων που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μία θέση δόλωσης (ποντικού ή αρουραίου).

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είδος στόχος	Πεδίο εφαρμογής	Δοσολογία
Ποντικός (<i>Mus musculus</i>)	Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια	5 έως 20γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 5 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 2 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές.
Αρουραίοι (<i>Rattus rattus</i> , <i>R. Norvegicus</i>)	Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια	10 έως 60γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 5 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές.
	Υπόνομοι (*)	20 έως 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε τα δολώματα να μην έρχονται σε επαφή με τα νερά του υπονόμου ή να μην παρυστρώνονται από αυτά.

(*) Μόνο από επαγγελματίες χρήστες

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
(PROD. DATE):

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
(LOT No):

ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

RATCUM

0,005BB

Brodifacoum (Μηροναφόκουμ) 0,005%
Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας Υ.Α.Α.&Τ.: ΤΠ14-0054 (3-1-2014)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Brodifacoum 0,005% β/β
Βοηθτικές ουσίες 99,995% β/β
Περιέχει πικραντικό-αντορεπτικό παράγοντα denatonium benzoate
Χρώμα κόκκινο

... αποτελεσματικό
με μία μόνο δόση
του δολώματος!



ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΚΗΡΩΔΕΙΣ ΚΥΒΟΥΣ

Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο 2ης γενιάς, για καταπολέμηση ποντικών (*Mus musculus*) και αρουραίων (*Rattus rattus*, *R. Norvegicus*)

“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”

Κάτοχος της Έγκρισης: PELGAR International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο
Παρασκευαστής του σκευάσματος: PELGAR International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ,
Περίβολος 6,
145 64 Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ



Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.
Αγ. Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8542220, 210 8542270,
Fax. 210 8542253
www.protecta-health.gr
e-mail: info@protecta-health.gr



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

5kg	10kg

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά
- Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση
- Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
- Φοράτε προστατευτικά γάντια
- Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη). - Μην τοποθετείτε τα δολώματα σε επιφάνειες που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές. - Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. - Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό κατά το χειρισμό των δολωμάτων.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης”

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Το σκεύασμα περιέχει δραστική ουσία brodifacoum που είναι αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο.

Σε περίπτωση έκθεσης στο σκεύασμα καλέστε χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο Δηλητηριάσεων, το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών ή απευθυνθείτε σε κάθε περίπτωση σε ένα γιατρό, περιγράφοντας την κατάσταση των συμπτωμάτων της μόλυνσης (αναφέρετε τις οδηγίες πρόληψης και θεραπείας που αναγράφονται στην ετικέτα, επιληψύστε τη δόση και την έκταση της έκθεσης στη μόλυνση).

Παράλληλα προχωρήστε στις ακόλουθες ενέργειες:

- Σε περίπτωση εισπνοής: ανανέψετε καθαρό αέρα και αναπνεύστε.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: απομακρύνετε τα ενδύματα και πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά και χλωρίδα.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε με άφθονο χλιαρό νερό για αρκετά λεπτά έχοντας τα μάτια ανοικτά.

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. Ανεξάρτητα από τη ληφθείσα ποσότητα φαρμάκου, αποφύγετε τη λήψη τροφής ή ποτού. Σε περίπτωση έντονης αδιαθεσίας, επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση)

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

- Να αποφεύγεται η εξήλθειση του στο περιβάλλον
- Αποθηκεύστε κλειδωμένο μέσα σε κλειστό περιέκτη
- Απορρίψτε το περιεχόμενο/περίεκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς
- Αναζητήστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολωμάτων που δε χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά.
- Τα αντιπηκτικά τρωκτοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος: Τα δολώματα δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχισμό και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από το φως, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Καταστήματα πώλησης:

Πωλείται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

“Επιτρέπεται η πώληση του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων”