



# FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047  
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: [info@farmachem.gr](mailto:info@farmachem.gr)

**ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ**

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ**

## ΠΡΟΪΟΝ: DICOTEX

Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε χλοοτάπητα αγρωστωδών. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες. Μόλις απορροφηθεί, δεν ξεπλένεται και μεταφέρεται σε όλο το φυτό συσσωρευόμενο στους μεριστωματικούς ιστούς της νεαρής βλάστησης και των ριζών. Το Dicotex διακόπτει την ορμονική ισορροπία και παρεμβάλλεται στη διαδικασία ανάπτυξης νεκρώνοντας τα ζιζάνια.

Είναι πυκνό διάλυμα (SL) με 2,4-D 70g/L, MCPA 70g/L, Mecorprop-P 42 g/L: Dicamba 20g/L & Βοηθητικές ουσίες: 79,61% β/β

**Κάτοχος της έγκρισης:** AGRIPHAR S.A.

**Διανομή:** FARMA-CHEM S.A.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**

- Εφαρμόστε το σκεύασμα τουλάχιστον 5 ημέρες μετά το τελευταίο κόψιμο και περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες για το επόμενο.
- Μην ψεκάζετε νεαρή χλόη πριν το αδελφωμα και εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση.
- Η δραστηριότητα του προϊόντος ενισχύεται από ευνοϊκές για τη φωτοσύνθεση συνθήκες (θερμοκρασία και φως).
- Αποφύγετε εφαρμογές κατά την ξηρή περίοδο και όταν αναμένεται βροχή εντός 24 ωρών.
- Εφαρμόστε σε στεγνό γρασίδι.
- Δε συστήνεται η χρήση του αμέσως μετά από δραστική/κοντή κοπή.
- Μην χρησιμοποιείτε τα υλικά από τα τρία πρώτα κουρέματα για την παρασκευή κομπόστ.
- Μην ψεκάζετε λιβάδια καθώς το σκεύασμα είναι δραστικό στο τριφύλλι.
- Τα ψεκασμένα φυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.
- Μην εφαρμόζετε σε έδαφος που ενδέχεται να οδηγεί σε σημείο παροχής νερού, ιδιαίτερα εάν το έδαφος είναι επικλινές.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:**

Απαγορεύεται η πρόσβαση σε σκύλους για 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Απαγορεύεται η πρόσβαση σε φυτοφάγα ζώα για 15 ημέρες μετά την εφαρμογή

Συνιστάται η πρόσβαση ανθρώπου σε ψεκασμένες περιοχές όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει εντελώς, δηλαδή 6 ώρες μετά την εφαρμογή.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		l/ στρέμμα (max)	l/100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Χλοοτάπητες Αγρωστωδών (NNNFW/YNIGF)	Πλατύφυλλα ζιζάνια: Τριφύλλια ( <i>Trifolium</i> sp. - TRFSS), Αγριοράδικα ( <i>Taraxacum</i> sp. - TARSS), Ρανούνκουλος ( <i>Ranunculus</i> sp. - RANSS), Πολυκόμπι ( <i>Polygonum</i> sp. - POLSS), Καρδαμίνη ( <i>Cardamine</i> sp. - CARSS), Στελάρια ( <i>Stellaria media</i> - STEME), Περδικούλι ( <i>Anagallis Arvensis</i> - ANGAR), Αγριοκαρότο ( <i>Daucus carota</i> - DAUCA), Κεράσιο ( <i>Cerastium</i> sp. - CERSS), Ζωχός ( <i>Sonchus</i> sp. - SONSS), Γαϊδουράγκαθο ( <i>Carduus</i> sp. - CRUSS), Κίρσιο/ Ασπράγκαθο ( <i>Cirsium</i> sp. -	1	1	100	Ψεκασμός Φυλλώματος. Δεν εφαρμόζεται πριν το στάδιο του αδελφώματος της χλόης.	1 Από Απρίλιο- Σεπτέμβριο

	CIRSS), Πεντάνευρο ( <i>Plantago</i> sp. - PLASS), Μαρτιάκος ( <i>Senecio</i> <i>vulgaris</i> - SENVU, <i>Senecio</i> <i>jacobea</i> - SENJA), Αγριομαργαρίτα ( <i>Bellis perennis</i> - BELPE), Λάπαθο ( <i>Rumex</i> sp. - RUMSS)					
--	---	--	--	--	--	--

#### **Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός φυλλώματος.

#### **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με λίγο νερό. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό.

#### **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Συστήνεται το ξέπλυμα του ψεκαστήρα με διάλυμα 1% αμμωνιακού ή 1% ανθρακικού νατρίου και όχι μόνο με νερό. Μη χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα για άλλο προϊόν αν δεν τον ξεπλύνετε. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

#### **Φυτοτοξικότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό ακόμα και στη διπλάσια από την συνιστώμενη δόση.

#### **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. Προφυλάξτε το προϊόν από συνθήκες παγετού.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 **μέτρων** από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς 75%.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**